



Sottospecie di Spermophilus Citellus

Ci sono 9 sottospecie di Spermophilus Citellus :

Sp. Citellus citellus

-Linneaus,1766- distribuito largamente in Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia e Ungheria.

Sp. Citellus gradojevici

-Martino & Martino,1929- nelle valli del fiume Vardar e del lago Dorjan ; Macedonia

Sp. Citellus karamani

-Martino & Martino,1940- Presente nei prati alpini e nei pascoli in Macedonia : Montagne Karadzica, rive del fiume Patiska.

Sp. Citellus isticus

-Calinescu,1935- Area montuosa, pianura del Danubio, Romania (Ruzic 1978).

Sp. Citellus laskarevi

-Martino & Martino, 1940- E' più piccolo e ha una coda più corta rispetto allo Sp. Citellus citellus, è presente nella parte sud-est della Panonia (Ruzic 1978) . In accordo con Pesev (1955) alcune popolazioni bulgare di Sp. Citellus dipendono anche da questa specie.

Sp. Citellus martinoi

-Pesev,1955- Montagne Rila, Bulgaria. L'esistenza di questa specie è da imputare a Ondrias (1966)

Sp. Citellus balcanicus

-Markov,1957- Montagne bulgare. L'esistenza di questa sottospecie è dovuta a Ondrias (1966), Ruzic (1978) invece considera lo Sp. Citellus Martinoi e Balcanicus come un'unica specie.

Sp. Citellus thracius

-Mursaloglu,1964- Presente nella parte europea della Turchia.

Sp. Citellus macedonicus

-Fraguedakis-Tsolis,1977- Questa specie è stata identificata in base alle differenze su base immuno-istochimica della popolazione Potokomi (Macedonia greca) dalla popolazione degli altri Sp. Citellus