

Sintomi – cause – trattamenti

Sintomi	Possibili cause	Trattamenti
Il cdp si gratta molto e appare inquieto	Parassiti come gli acari e le pulci etc..Contagio per animali nuovi o per il fieno ma anche per mancanza di igiene nella gabbia.	Contattare il veterinario. Eliminare i parassiti e migliorare la situazione ambientale (pulire meglio la gabbia e con più frequenza). E' necessario disinfettare tutta la gabbia e dintorni.
Mancanza di pelo,zone di cute arrossata	Parassiti (vedi sopra),micosi,muta,alterazioni ormonali,morsi e talvolta deficit di vitamine	Contattare il veterinario. In caso siano funghi bisogna disinfettare a fondo per eliminare le spore.
Il cdp tiene la testa inclinata di lato o la agita, si gratta le orecchie, può avere alterazioni dell'equilibrio.	Infezioni dell'orecchio o parassiti nell'orecchio.	Contattare il veterinario. In caso di otite può essere utile usare una lampada riscaldante.
Infiammazioni,	Tumore, ascesso() , ostruzione di una ghiandola sebacea.	Trattamento veterinario,intervento chirurgico.
Diminuzione dell'appetito	Problemi dentali, alimentazione non adeguata, ibernazione.	Se si verifica in inverno può essere che il cdp si stia preparando per l'ibernazione. In caso di problemi dentali portare il cdp dal veterinario. Dare al cdp un legno da rodere per consumare i denti.

Secrezione salivare abbondante, pelo umido sulla mandibola, difficoltà a mangiare	Problemi dentali come dente rotto per una caduta, infezioni, periodontite, tumore alla radice del dente.	
Perdita di peso		
Il cdp si sforza ad urinare e defecare ma senza riuscirci. Si mostra inquieto e strofina la parte posteriore per terra e talvolta può avere ematuria.		
Pelo attaccato nella regione anale, diarrea a volte con un cattivo odore.	Cattive condizioni igieniche, deficit vit B, infezioni (generalmente coccidiosi) allergia alla frutta, verdura o altro alimento.	
Ventre gonfio e molto sensibile	Gas dovuti ad una alimentazione sbagliata o parassiti	Chiamare subito il veterinario! Non dare alimenti come il cavolo!
Movimenti anormali delle estremità, zoppia e restrizione dei movimenti.	Solitamente si tratta di fratture, slogature o lesioni della colonna dovute a cadute. Talvolta può essere dovuto alle unghie troppo lunghe.	Fare in modo che il cdp consumi spontaneamente le unghie,
Comportamento apatico; aumento eccessivo della FR fino ad arrivare all'affanno.	Shock dovuto al calore o allo stress.	Chiamare immediatamente il veterinario. Togliere la gabbia dal sole, evitare possibili situazioni di stress, mettere a disposizione acqua fresca (non fredda).

	<p>Generalmente si tratta di lesioni causate dal fieno o per l'entrata di corpi estranei, substrato polveroso o correnti d'aria, talvolta può essere sintomo di diabete.</p>	<p>Usare una base che faccia meno polvere, trattare gli occhi con una pomata adeguata (consultare il veterinario), verificare che la gabbia non sia esposta a correnti d'aria.</p>
<p>Secrezioni dalla bocca e dalle narici e starnuti. Il cdp si pulisce spesso le narici.</p>	<p>Raffreddore o polmonite, non corretta ubicazione della gabbia, corrente d'aria, suolo troppo freddo, infezioni delle vie aeree causate da batteri o parassiti, forte reazione allergica al fieno o al substrato della gabbia.</p>	<p>Separare del gruppo il cdp, contattare rapidamente il veterinario,mantenere caldo il cdp con una lampada,aumentare le comodità nel nido (più fieno per il nido e niente correnti d'aria.</p>
<p>Tristezza, apatia, inattività, svogliatezza.</p>	<p>Difficoltà di comunicazione con i suoi compagni o assenza di questi, diminuzione della cose da fare,eccesso di peso.</p>	<p>Non tenere un solo cdp!!!</p>